

26. n° 23.

# Mémoire Pathologique

## Sur les lésions de la moëlle de l'épine

---

La science du Diagnostic, on ne sauroit trop le répéter, est la base fondamentale de l'art de guérir. on ne va qu'en tâtonnant quand on en est incertain sur le siège, l'étendue, le caractère d'une maladie, et dans le cas même où une incurabilité absolue seroit démontrée, la connoissance exacte du mal sauvera des tentatives qui ne seroient d'aucune conséquence si elles n'étoient qu'inutiles, mais qui sont presque toujours dangereuses et qui précipitent les malades.

Les blessures de la moëlle de l'épine ont de tous les tems été regardées, et avec raison, comme mortelles, mais il n'en pas moins essentiel d'établir les signes qui annoncent les diverses espèces de lésion de cette partie, et sur les quels le chirurgien peut avoir son pronostic; cette connoissance des signes est d'ailleurs de la plus grande importance dans la chirurgie légale. Aussi voyons nous dans les auteurs qui ont écrit sur les plaies, qu'ils ont cherché à en établir le diagnostic, mais d'après un trop petit nombre de faits; ils ont regardé la paralysie de toutes les parties qui sont au dessous de la blessure comme un signe univoque, quand cependant la situation du coup ou de la plaie appuyoit ce signe purement rationnel. D'où ils pensoient que l'absence de cet accident excluait tout soupçon de lésion à la moëlle de l'épine.

Ces règles sont vraies et sages, elles sont le fruit de l'observation, mais elles sont trop générales, et des faits ultérieurs ont démontré que l'absence de la paralysie ne suffit pas toujours pour assurer sur les crintes de la lésion de cette partie essentielle de l'économie animale.

il faut donc chercher d'autres signes, qui, dans le cas où la paralysie manqueroit, puissent désigner cette lésion et servir de base à un pronostic non douteux. Cette recherche est difficile, c'en pour y concourir que je ~~présente~~ <sup>présente</sup> à l'Académie royale de chirurgie quelques observations



APC41  
n° 64

qui me sont propres, en que j'y joint celles fournies par les auteurs qui m'en semble mériter une attention plus particulière.

Je distingue deux sortes de lésion de la moëlle de l'épine, l'une par compression et l'autre par division.

La compression, quand elle est assez forte pour suspendre ou pour ralentir la marche du fluide ou esprit animal, cause la paralysie ou l'engourdissement de toutes les parties qui reçoivent le mouvement et le sentiment de la portion médullaire qui en a été pour ainsi dire étranglée; mais il faut que cette compression vienne d'un dérangement subit dans la colonne vertébrale, ou de la présence d'un corps étranger venu du dehors; car il est rare qu'un dérangement insensible et gradué donne lieu à des accidents de ce genre.

Il semble cependant que ceux qui ont la colonne épinière viciée éprouvent des accidents relatifs à la difficulté que la moëlle trouve à faire ses fonctions. les boiteries sont fluettes et minces dans les extrémités; si le dérangement est dans les vertèbres cervicales ou dans les premières dorsales, leur poitrine est serrée, leur respiration moins libre: en général, le visage et la voix éprouvent de si grandes altérations dans les boiteries, qu'il n'est pas difficile de les distinguer par la voix seule ou par l'air du visage.

Ils ont un esprit à eux propres; ils réussissent dans les arts d'agrément, ils ont de la mémoire; mais ils semblent moins propres aux sciences abstraites, aux profondes méditations.

1<sup>re</sup> observation. Mathieu Delair, du village de Rochefort en franche-Comté, âgé de 17 ans, épileptique depuis longtemps, tomba en 1772 du haut d'un rocher d'environ 50 pieds; il se trouva heureusement au pied de ce rocher un tas de fumier qui lui sauva la vie, mais sa poitrine porta sur une pierre assez grosse, et quoique la percussion eût été beaucoup moins forte que si la pierre avoit eu pour base un terrain solide, il y eut cependant une forte contusion sur le sternum.

Les saignées, les boisons vulnérables, les lavemens furent employés pour prévenir les suites de cette chute. On ne tarda pas à s'appercevoir que la moitié inférieure du corps étoit entièrement

paralysée, et que le sentiment y étoit considérablement affaibli. On aida les fonctions de la respiration et des intestins au moyen de la soude et des lavemens. Peu à peu les fonctions du bas ventre se rétablirent, et au bout d'un mois le malade se passa de secours; les extrémités inférieures sont demeurées paralysées.

On s'aperçut au bout de quelques mois que l'épine se courboit en arc de derrière en devant. La poitrine s'en étoit également déformée: le sternum fait saillie en dehors, tandis que les côtes se sont affaissées et rapprochées du centre de cette capacité. Les frictions, les douches, les applications les plus stimulantes, n'eurent d'autre effet que de rappeler un peu la sensibilité dans les parties engourdies. Ces accidens n'ont point interrompus les accès épileptiques. Le sujet va, au moyen d'un cul de jatte, mendier sur les chemins.

Il est présomable que dans ce cas les accidens primitifs ont dépendu de la commotion de la moëlle de l'épine, et les consécutifs, c'est à dire la déformation de l'épine et de la poitrine, de la paralysie de plusieurs de leurs muscles, et de l'action trop puissante de plusieurs autres. La déformation de l'épine a été sans doute un obstacle à la réintégration de la moëlle de l'épine, et peut être même s'est-il fait quelque épanchement dans son canal qui est devenu insoluble par concrétion.

Le fait suivant offre des accidens et une terminaison funeste, résultants d'un délabrement considérable dans la colonne vertébrale.

II observ. Une femme de 40 ans du village de Chatenois en franche Comté, fit une chute de dessus un cerisier, d'environ 12 pieds de haut; la tête fut précipitée la première, et elle fut renversée en arrière la face ayant porté contre terre. Cette femme ne perdit point la connoissance, elle n'eut aucune évacuation de sang par la bouche ni par les oreilles, en un mot, il ne parut aucun signe qui annonçât lésion à la tête. Toute la percussion sembloit avoir porté sur la colonne vertébrale. Les fonctions de la langue furent aussitôt dérangées; la parole fut begayante, inarticulée, et la voix considérablement affaiblie. Elle se plaignoit de fortes douleurs



dans les bras et aux parties latérales du cou; les muscles mastoïdiens étoient livides et tendus. Le ventre, les cuisses et les jambes de. étoient dans une sorte de stupeur et d'engourdissement qui avoit presque éteint la sensibilité, mais ces parties faisoient encore quelques mouvements, quoiqu'avec peine.

Tel étoit l'état dans le quel je trouvai cette femme, environ une heure après son accident. J'examinai l'épine dans toute sa longueur sans rien découvrir qui pût indiquer un dérangement dans la disposition des pièces osseuses qui la composent. Au surplus la malade étoit très-replète, ce qui rendoit cet examen difficile. Les saignées, les boissons delayantes et vulnérâires furent employées d'abord; quelques verres d'eau chaude convertirent des nausées fréquentes en vomissemens, et ouvrirent l'estomac qui étoit rempli d'alimens. Je fis faire des embrocations anodines et vulnérâires le long de l'épine et des frictions sèches et chaudes sur les parties stupéfiées.

Le lendemain la malade se plaignoit de douleurs à la nuque et à la partie postérieure de la tête; en appuyant un peu fort avec les doigts on étoit une sensation vive, qui répondoit à la quatrième et cinquième vertèbre du cou; sans cependant que le tact y découvrit aucun dérangement, toutes les parties inférieures qui n'étoient qu'engourdies la veille se trouvoient entièrement privées de mouvement et de sentiment. La vessie ne contenoit point d'urine, les lavemens ne pénétraient qu'imparfaitement dans le canal intestinal. Les bras étoient engourdis et douloureux, mais ils étoient encore susceptibles de mouvement. La respiration étoit pénible, et il venoit quelques crachats sanguinolents. La malade mourut le même jour, vingt une heures après sa chute.

Les parens ne voulurent point absolument consentir à l'ouverture du cadavre.

On ne peut former que des conjectures sur le désordre que cette chute avoit causé dans la disposition des pièces osseuses de l'épine; il est certain cependant que la moelle épinière éprouvoit une compression forte dans un point de sa portion cervicale.

Estée dans l'endroit douloureux, reconnu par la pression, le lendemain de la chute? je le presume; les accidens en leur gradation jusqu'au moment de la mort semblent confirmer ma conjecture.

La tête renversée en arrière, entraîne avec elle les vertèbres cervicales, soit qu'il y ait eu déchirement ou allongement dans les ligamens très-forts qui les lient ensemble, les apophyses épineuses très-inclinées dans ces vertèbres, ou du être prodigieusement pressées les unes sur les autres, et il en a pu résulter la fracture de quelques-unes; alors rien n'empêche qu'elles ne pénétrassent dans leurs aspérités et leurs fragmens dans le canal des vertèbres, ne déchirassent l'enveloppe de la moëlle, et n'aillassent même jusqu'à la substance (a) Une telle renversement de la tête ne sauroit avoir lieu, d'ailleurs, sans un dérangement marqué dans les apophyses obliques dans les cartilages intervertébraux, et le moindre <sup>des</sup> accidens qui paroît <sup>devoir en</sup> résulter est la luxation des vertèbres.

Plusieurs auteurs admettent la possibilité de guérir la luxation des vertèbres. Mais il en est peu, ou peut-être point, de ceux qui fassent de ce sentiment qui puissent citer une observation irréversible en faveur de leur opinion. Ils ont imaginé des manœuvres ou ridicules ou impraticables pour faire des extensions sur l'épine, et ils en ont conseillé l'usage comme si elles avoient eu fréquemment entre leurs mains les plus grands succès. Tous les praticiens nous pas donné dans cette opinion flatteuse; la plupart convaincus par leur expérience de la futilité de ces moyens de guérison, nous pourrions dissimuler leurs craintes. Celle assure que toute luxation des vertèbres est mortelle, et si la croit irréductible, ne pouvant se faire sans déchirement des ligamens. Il admet un relâchement dans ces ligamens qui peut permettre à une vertèbre de se dé ranger légèrement, sans cependant se luxer entièrement, mais, selon lui, cette espèce de luxation est également irréductible. (b) Ces auteurs disent que quand la luxation est au dessus du diaphragme, on a observé que les bras deviennent paralytiques, qu'il y a vomissemens et convulsions, que la respiration est difficile, qu'il y a des douleurs aiguës, et qu'on perd l'usage du bras.

(a) *Soranus*, observe que les fractures des vertèbres sont plus communes que les luxations. il en décrit de plusieurs espèces, sur tout avec compaction, il veut dire en plusieurs piéces avec enfoncement est. *Cocchi*, dans une note sur ce passage, remarque qu'il n'étoit donné qu'à des dissections pathologiques de mettre la compaction à la doctrine de ces auteurs; et d'après ces mêmes dissections, il atteste la réalité de l'enfoncement de l'apophyse épineuse dans la gouttière ou cavité de la colonne vertébrale. Voyez l'histoire de la chirurgie tom. II par M. Leguillier pag. 252 et 253

(b) Voyez *Celle* l. VIII. C. XIV.



Si la luxation est au-dessus du diaphragme & sous les extrémités inférieures qui deviennent paralysées, ou il y a suppuration, ou écoulement involontaire d'urine, & si l'on ajoute que dans l'un ou l'autre cas, la mort ne tarde guères au-delà du troisième jour. Cette remarque, avec raison, que lors qu'Hippocrate a parlé des luxations des vertèbres & des moyens d'en opérer la réduction, ne peut être que des luxations incomplètes par relâchement des ligaments.

Forester & Fabricius de Hilden sont du même sentiment que Celse, ils regardent comme mortelle la vraie luxation des vertèbres, mais ils admettent une luxation imparfaite qui selon eux est curable. Hilden en fournit même deux exemples, obs. 68. com. 5.

M. Hauehart professeur en médecine de l'université de Tubingen, a publié en 1767 une dissertation sur la luxation de la langue, qui n'est qu'un commentaire de l'opinion de Celse. L'auteur regarde la luxation des vertèbres comme très difficile, à raison de la force des ligaments & de la disposition de ces pièces osseuses; mais elle est mortelle dès qu'elle a lieu, il appuie son opinion de trois observations circonstanciées de luxations des vertèbres du cou, qui ont causé la mort à l'instant ou peu d'heures après.

(C) Cette dissertation est insérée dans le 11<sup>e</sup> vol. du recueil des thèses de M. de Halle.

M. Hauehart a toujours trouvé à l'ouverture des cadavres les ligaments déchirés. (C) La luxation incomplète n'en guères plus curable, selon lui, que la complète, & il assure que si les secours peuvent quelquefois réussir, on la voit aussi très-souvent être au-dessus de toutes les ressources.

III obs. Un fait publié par M. Murray, professeur en médecine à Upsal, semble très-contraindre au sentiment des auteurs que je viens de citer. Un homme se trouvant serré par une voiture d'étoffe sur la dernière vertèbre du dos luxée, à sa jonction avec la première des lombes. Une heure après le dos étoit courbé en avant, l'endroit luxé enflé & douloureux; l'urine s'échappoit involontairement. Le malade pouvoit cependant encore se soutenir sur ses jambes. Toutes les tentatives que l'on fit pendant plusieurs jours pour réduire cette luxation furent inutiles; mais les douches répétées d'eau froide pendant sept jours opérèrent une guérison complète. M. Murray croit que dans ce cas il y a eu rupture

(C) M. Lervisal Pott, célèbre chirurgien anglais, pense à peu près de même que M. Murray, au sujet des ligaments, mais il ne regarde pas cet accident comme fort dangereux. (C) Il seroit un peu hardi d'oser soupçonner l'auteur de s'être trompé sur la nature de la maladie; mais s'il m'est permis de hasarder quelques conjectures

du desir d'obtenir des  
ligamens, opinion  
que je crois avoir  
combattu avec avantage.  
D'après l'observation  
dans un memoire sur  
la luxation particuliere  
du rayon, envoye a  
l'Academie royale  
de chirurgie en 1776.  
L'ouvrage dans lequel  
M. Murray a public  
le fait que j'ai rapporte  
est une these soutenue  
a l'hopital pour servir de  
ayant pour titre: De  
Spina dorsi luxationibus  
voy. la gazette salubre  
n.º XV an. 1792

sur ce fait, je dirai que je n'y vois qu'une contusion forte, avec epandement  
des sucs ou gonflement des ligamens dans le voisinage de la vertebre  
designee; que les douches d'eau froide ont procure la resolution des sucs  
excessifs les accidens; que la stupor en ce cas n'etoit qu'une suite d'une  
legere commotion a la partie correspondante de la moelle epiniere.

Les observations analogues a celles ne sont point rares.

IV obs. Une fille de vingt ans, tomba de huit a neuf pieds de haut,  
elle se trouva debout, et tout le choc de la chute porta sur les plantes  
des pieds: cependant cette fille fut aussitot paralitique des extremités  
inferieures; elle eprouvoit des douleurs vives dans les lombes et dans les sacrum  
la vesie et le rectum ne faisoient que tirer difficilement leurs fonctions;  
les urines ne sortoient que par regorgement. on n'apprehendoit aucun  
derangement dans l'épine. Deux saignées, des frictions aromatiques et  
chauder sur la region des lombes et sur les extremités guerirent cette  
fille en dix a douze jours.

Quand au pronostic de celle, sur la promptitude, ou la lenteur  
de la mort, qui suit toujours la luxation complete des vertebres, le  
terme de trois jours est un peu trop circonscrit. plusieurs perissent a  
l'instant même où se fait la luxation, mais beaucoup d'autres y survivent  
bien des jours ou des semaines même.

V et VI obs. Saviard rapporte deux observations qui prouvent qu'on  
peut vivre encore quelque temps avec une luxation mortelle. le sujet  
de la premiere avoit eu la onzieme vertebre dorsale luxee par une chute  
d'un troisieme étage; il vécut cependant six semaines, ayant toutes les  
parties inferieures paralysees, n'urinans que par la sonde et ne rendant  
ses excremens qu'au moyen des chyloteres. (e)

Le sujet de la seconde observation étoit frappe rudement la  
region des lombes sur les degres d'une cave, sans neanmoins se faire  
de fracture ni de luxation; cependant il fut sur le champ paralitique;  
au bout de quinze jours, la gangrene se montra aux environs de  
l'anus et gagna peu a peu toutes les parties voisines jusqu'aux vertebres  
et a la moelle epiniere. Le malade mourut le huitieme jour. il paroît  
que dans ce second cas les accidens et la mort qui s'en est suivie ont été  
occasionnés par la forte commotion de la moelle de l'épine, quoiqu'il

(e) nouveau recueil  
d'observations de chin  
pag. 145 et 146



soit très possible que dans un cas de cette espèce il y ait fracture à quelque vertèbre, sans apparence extérieure, que dans des fuites épanchées dans le canal, comprimant la moëlle, que des esquilles piquent et déchirent fermement, tandis que le Chirurgien le plus attentif et le plus expérimenté ne découvrira rien au dehors qui lui indique d'une manière positive la cause des accidents. J'ai à regretter que l'ouverture du cadavre n'ait pas été faite, elle aurait pu ainsi que dans les suites de notre seconde observation répandre du jour sur un sujet enroué, et qui n'a été examiné de bien près par personne.

VII. obs. Dominique Panerole dit avoir vu un homme qui vécut plusieurs jours avec une très grande luxation de la seconde vertèbre du cou; ce qui fut confirmé par l'ouverture du cadavre. (P)

Quoique nous n'ayons pas à beaucoup près sur les lésions de la moëlle de l'épine par compression, des observations assez nombreuses, assez certaines, pour pouvoir établir d'après elles un diagnostic et un pronostic bien évident, on peut cependant résumer des faits et des citations cy dessus, que la vraie luxation des vertèbres est toujours mortelle, plus ou moins promptement, relativement à la grandeur du déplacement et à la force de la compression de la moëlle épinière, qu'il peut exister une forte distension des ligaments sans luxation, mais avec épanchement de fuites et gonflement, et qui peut en imposer au chirurgien peu attentif pour une vraie luxation. Qu'en général les signes de celle-ci ne sont pas toujours bien clairs dans les premiers moments, mais que peu après, outre les signes communs à toutes les luxations, la paralysie des extrémités, celle des intestins, de la vessie, l'impossibilité de se soutenir sur la colonne épinière deviennent des signes pathognomoniques confirmés par l'observation et par la disposition anatomique des parties. Mais il faut que l'homme de l'art qui veut prononcer sûrement en cas pareil soit exercé et qu'il ne s'en laisse pas imposer par les apparences. L'absence de ces accidents fait presumer la non existence de la luxation, mais elle ne doit pas toujours nous rassurer sur les suites d'une forte distension d'une fracture de quelque <sup>portion de</sup> vertèbre, d'une blessure faite à la moëlle, d'un épanchement dans son canal, de accidents qui peuvent exister indépendamment de toute luxation, et dont le diagnostic est des plus difficiles.

(P) Dom. Panerole  
obs. Centocoste 2, obs. 26  
est un recueil d'observ. de  
Chirurg. imprimé à Genève  
en 1679 en 4 vol. in 4.  
tom. 1. p. 219

Les lésions de la moëlle de l'épine par division peuvent être de deux sortes; ou elle est entièrement coupée, ou elle ne l'est qu'en partie ou simplement divisée. Les accidens sont différens relativement à l'espèce de blessure; et quoiqu'elles soient également mortelles, les malades peuvent survivre encore plusieurs jours, plusieurs semaines et même plusieurs mois, lorsque les esprits ont encore assez de force pour fournir aux fonctions des parties qui sont au-dessous de la blessure. En ce cas la paralysie n'a pas toujours lieu comme accident primitif.

VIII. obs. Un soldat reçut un coup d'épée à la partie inférieure du dos; il fut pansé par un chirurgien et guéri en apparence en fort peu de temps; après quoi le soldat partit de Clermont en auvergne, pour aller à l'île de Rhé joindre son régiment. il fit ce voyage, qui est d'environ quatre-vingts lieues, avec beaucoup de peine; il ressentait de violentes douleurs dans la partie où il avait reçu le coup; il semblerait d'ailleurs jouir d'une bonne santé. Plusieurs chirurgiens qui l'examinèrent attribuerent ses douleurs à la cicatrice nouvellement formée; et ils assurèrent qu'elles se dissiperoient avec le temps. Cependant peu après son arrivée, ce soldat fut envoyé à l'hôpital des frères de la charité de Lyon pour y être traité du scorbut, où il fut guéri de cette maladie en un mois. il demanda alors avec instance qu'on examinât de nouveau le lieu de sa blessure, car outre les vives douleurs qu'il y ressentait, il souffrait encore de la tête et éprouvait un engourdissement assez considérable dans les extrémités inférieures. On découvrit en effet sous la cicatrice une fluctuation profonde, et l'ouverture donna issue à un bon verre d'une matière ferreuse et rouille. Le frère-chirurgien de la charité y porta le doigt et sentit un corps dur, qu'il saisit et tira sans beaucoup de peine. C'était un bon d'épée, long de deux pouces, qui étoit resté dans la plaie. Le malade fut saisi de mouvements convulsifs très-violents, et il survint par toutes les voies; la tranquillité succéda peu de temps après, avec l'espérance d'une prompte guérison; mais deux heures après l'opération, la fièvre s'alluma, le délire survint; le malade tomba dans un



état léthargique, et il mourut trente ~~et~~ six heures après malgré les saignées et les autres secours.

On reconnut à l'ouverture du cadavre que l'épée avoit perçé la partie <sup>postérieure</sup> de la douzième vertèbre du dos entre les apophyses obliques du côté gauche; que le tronçon qui étoit demeuré dans la plaie, traversoit le corps de la moëlle de l'épine et le canal vertébral; que la pointe alloit même se loger au delà, du côté droit de la onzième et douzième vertèbres du dos. la pièce a été montrée à l'académie royale des sciences, par M. Ferrein; les bords opposés de la plaie ont végété autour du tronçon pendant le temps qui s'est écoulé depuis la blessure jusqu'à

(g) Hist. de l'acad.  
royale des sciences  
an. 1760 pag. 30.  
Cette observation se  
trouve aussi dans  
la Bibliothèque de  
med. de l'Académie  
tom. VII pag. 251

la mort (g)  
il n'y a peut-être pas d'exemple qu'on ait survécu aussi longtemps à une pareille blessure, sans qu'il y ait eu aucuns accidens primitifs. il n'en est pas de même des blessures du cerveau, même avec perte de substance; on sçait que ce viscere peut souffrir des lésions considérables sans causer la mort et même quelquefois sans accident; d'ailleurs si les observations relatives aux lésions de la moëlle épinière sont rares, c'est que cette partie est moins exposée aux blessures que le cerveau, que les cas sont plus difficiles à observer, qu'il est facile de s'y tromper surtout dans ceux dont le diagnostic est un peu douteux, et que l'examen cadavérique présente plus de difficultés.

IX. obs. Le nommé Delort, chapeau à cheval, du premier regiment, Compagnie de la Barollière, fut blessé le quatre décembre 1782, d'un coup de sabre qui pénétra dans la poitrine, en passant sous l'aisselle, entre la seconde et la troisième côte du côté droit. Ce blessé fut apporté à l'infirmerie du regiment une heure après avoir reçu le coup; il avoit passé ces intervalles couché dans la neige. il perdoit par la plaie un sang noir et épais, tandis qu'il en exhaloit qui étoit vermeil et écumé. Cet homme parloit avec peine, mais il pouvoit des gemissemens et sçavoit qu'il étoit perdu. il vomissoit de temps à autre des matières brunes mêlées de sang, il se jettoit hors de son lit et s'agitoit si fort, particulièrement des extrémités inférieures qu'on fut obligé de s'attacher. Enfin il mourut

dans des agitations extraordinaires se firent heurer après la blessure.

À l'ouverture du cadavre je trouvai dans la partie droite de la poitrine environ deux livres de sang. Le poulmon étoit percé dans sa partie moyenne de part en part, et la pointe du sabre alloit se perdre à la partie latérale droite de la colonne vertébrale, entre les extrémités de la cinquième et de la sixième côtes. Elle avoit pénétré dans le canal spinal, par le trou latéral qui répond à cet endroit et avoit coupé ou plutôt dilaté la moëlle épinière dans les deux tiers de son épaisseur. Pour mieux voir toute l'étendue du délabrement, je détachai du cadavre la vertèbre à la quelle repondoit la blessure avec les deux qui sont au dessus et celle qui en est au dessous; je fis ces côtes, à deux poulmon de leur articulation, et je fis cuire la pièce pendant quelques heures dans l'eau. Je trouvai du sang épanché dans le canal, tout autour de la moëlle, de la longueur de plus de quatre doigts, celle-ci dilatée dans plus des deux tiers de son épaisseur, n'en restant qu'une portion qui repondoit à la paroi gauche du canal. Les muscles qui recouvrent le corps de la colonne épinière du côté droit étoient livides et infiltrés.

Le sabre qui a fait cette blessure en large et peu tranchant, on y voit même à deux poulmon de sa pointe deux dentelures assez profondes, et la lame en un peu faussée en cet endroit.

Il n'y a pas eu ici le moindre indice de paralysie, les extrémités inférieures ont au contraire presque toujours été dans une agitation convulsive extraordinaire. Il en a présumer que sans la plaie du poulmon le blessé auroit survécu plus longtemps à celle de la moëlle épinière; peut-être alors la paralysie se feroit-elle montrée consécutivement comme dans les sujets de la précédente observation.

En examinant avec attention les observations qui nous ont été conservées sur les blessures de la moëlle épinière, on voit que, dès que la section de cette partie n'est point totale elle est toujours accompagnée de mouvements convulsifs soit dans les parties qui sont au dessous ou au dessus, soit dans les muscles voisins. Gallépe dit avoir observé ces convulsions promptement suivies de la mort. (b) M. Herin, célèbre chirurgien de Paris, a vu une

(b) Voy. Examen des plaies mortelles de Bernard Linné. part. 2. chap. 2



(1) Cours de  
Pathologie et de  
Thérapeutique  
chirurgicale p. 615

fracture des vertèbres du cou faite par un coup de pistolet qui fut suivi de mouvement convulsif, qui firent périr le blessé très promptement. (1)

Quelle peut être la cause de ces convulsions? Serait-ce l'évulsiion du sue nerveux par la plaie du canal médullaire destiné à le transmettre aux organes? Ne serait-ce point un dernier effort de la nature expirante pour rassembler le peu de vie qui lui reste et prévenir sa dissipation totale? On se rappellera que les convulsions ne surviennent chez les soldats blessés à Clermont en Auvergne, que lorsqu'on en retire le tronçon d'épée qui traversoit la moëlle de l'épine.

(1) lib. 1

X obs. Felix Plateu, professeur en médecine dans l'université de Basle, rapporte dans ses observations (1), l'histoire d'une fille qui, à la veille de se marier, fut blessée au dos par une balle de pistolet; elle revenant d'un village voisin, montée en croque, et elle seroit tombée si l'homme derrière le quel elle étoit ne l'en retenu, car elle devint tout aussitôt perdue de toute la moitié inférieure du corps avec perte de sentiment.

La plaie étoit exactement ronde, et répondoit à la huitième ou à la neuvième vertèbre du dos; elle presentoit l'aspect d'un sinus profond, autour du quel on n'apprenoit aucune tache ni échinose. Par la sonde, on découvrit une esquille de vertèbre, qui ne laissa plus aucun doute sur la nature de la plaie. Il se passa dix jours sans accident autre que la paralysie des parties inférieures, mais alors il survint un vomissement importun, une chaleur vive au haut de l'épine, une forte douleur de tête, et des convulsions à la partie postérieure du cou. La malade mourut le vingtième jour. La dissection du cadavre découvrit la balle qui avoit rompu la moëlle de l'épine, et s'étoit arrêtée dans le corps de la vertèbre. Cette balle étoit aplatie du côté par le quel elle avoit frappé les, et elle avoit chassé devant elle une partie de la bourse.

Ici les extrémités inférieures sont privées de sentiment aussitôt le coup reçu, par ce que la moëlle de l'épine se trouve rompue entièrement, et que toute communication du sue nerveux etern interrompue, les parties qui en sont privées perdent leur vitalité. Les parties supérieures ne s'en sont trouvées épuiser que peu à peu à mesure que ce fluide spirituel s'échappoit par le bout tronqué de la moëlle; mais cette

perte portée au point que ne se trouvant point après de ce que dans les organes qu'il doit vivifier, ceux-ci entrent dans un état convulsif pour retenir la vie qui leur échappe. Les convulsions de l'estomac prouvées par le vomissement opiniâtre, celles de l'épine qui survinrent après dix jours de la blessure semblent s'expliquer assez clairement par notre hypothèse. idée, au reste, jetée ici au hasard et sans prétention, notre seul but étant de rassembler des faits qui puissent éclaircir le diagnostic des blessures qui font le sujet de ce mémoire.

XI obs. Tulpinus rapporte que le fils de Lambert Spem, reçut un coup de poignard à la moëlle de l'épine, et qu'il tomba à l'instant avec stupéfaction des parties inférieures. Les intestins et la vessie ne purent être excités par les médicaments les plus actifs; le ventre s'étendit, il survint une très-grande fièvre, avec distension des nerfs et défaillance; le corps devint froid et couvert de sueur, et le blessé mourut trois jours après sa blessure.

Il auroit été intéressant que l'auteur eût désigné l'endroit de la moëlle qui avoit été lésée, et qu'il eût dit si elle étoit coupée entièrement, (ce qui est presumable) ou si elle ne l'étoit qu'en partie. Au reste que le blessé a survécu, il est à penser que le coup n'étoit point à la partie supérieure de la moëlle, car les observateurs remarquent que les lésions de cette partie sont d'autant plus promptement mortelles qu'elles sont plus près de son origine. (m)

(m) V. les deux obs. rapportées par est.

Pétit aux pages

66 et 67 du 1<sup>er</sup> vol.

des traités des

maladies des os,

en l'athèse de

M<sup>r</sup> Maubart

cité plus haut

Je suis bien éloigné de croire avoir éclairci le sujet obscur que j'ai entrepris de traiter; mon but a été de le débrouiller un peu, et de rassembler quelques matériaux, qu'une main plus habile pourra employer. Je n'ai point traité à dessein des lésions consécutives de la moëlle de l'épine à la suite des chûtes, des depôts, des douleurs de rhumatisme &c. Quoique ces sujets, sur lesquels nous sommes déjà riches en observations, méritent d'être discutés et présentés d'une manière nouvelle relativement à la pratique. Je laisse aux personnes qui ont plus de courage et de talent que moi à entreprendre cette tâche, bien au dessus de mes forces et de mes connoissances.

Thomassin, correspondant de l'académie, de celle des sciences belles lettres et arts de M<sup>r</sup> de la Harpe et Dijon, et Chirurgien major du 1<sup>er</sup> Rég<sup>t</sup>. de Chapeau à cheval.

Paris le 19<sup>th</sup> 1785



first part of the manuscript is written in a very  
good hand, and is very clear and legible.  
The second part is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The third part is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The fourth part is written in a very  
different hand, and is very illegible.

It is very difficult to read the  
manuscript, as the handwriting is very  
different from the modern hand.  
The first part is written in a very  
good hand, and is very clear and legible.  
The second part is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The third part is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The fourth part is written in a very  
different hand, and is very illegible.

The manuscript is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The first part is written in a very  
good hand, and is very clear and legible.  
The second part is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The third part is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The fourth part is written in a very  
different hand, and is very illegible.

The manuscript is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The first part is written in a very  
good hand, and is very clear and legible.  
The second part is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The third part is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The fourth part is written in a very  
different hand, and is very illegible.

The manuscript is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The first part is written in a very  
good hand, and is very clear and legible.  
The second part is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The third part is written in a very  
different hand, and is very illegible.  
The fourth part is written in a very  
different hand, and is very illegible.